

02755

INFEKTIONEN VORBEUGEN- WUNDHEILUNG FÖRDERN



BETAISODONA® SALBE UND LÖSUNG

MUNDIPHARMA GmbH, 6250 Limburg (Lahn) · **Betaisodona® Salbe · Zusammensetzung:** 1 g Salbe enthält: 100 mg Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon)-Iod-Komplex (Polyvidon-Iod), MMG 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod. **Anwendungsgebiete:** Verbrennungen, Schnitt- und Schürfwunden, Dekubitus, Ulcus cruris, Hautinfektionen und superinfizierte Dermatosen. **Dosierung und Anwendung:** Betaisodona Salbe wird mehrmals täglich gleichmäßig auf die erkrankte Stelle aufgetragen. Falls erforderlich, kann anschließend ein Verband angelegt werden. **Betaisodona® Lösung standardisiert · Zusammensetzung:** 10 ml Betaisodona Lösung enthalten: 1 g Poly(1-vinyl-2-pyrrolidon)-Iod-Komplex (Polyvidon-Iod), MMG 40 000, mit einem Gehalt von 10% verfügbarem Iod. **Anwendungsgebiete:** Haut- und Schleimhautdesinfektion vor Operationen, gynäkologischen und geburtshilflichen Maßnahmen, Biopsien, Injektionen, Punktionen und Blutentnahmen. Antiseptische Wundbehandlung, Verbrennungen, Pyodermien, bakteriell und mykotisch infizierte und superinfizierte Dermatosen. Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. **Dosierung und Anwendung:** Betaisodona Lösung unverdünnt auf die zu behandelnde Stelle auftragen. Nach dem Eintrocknen bildet sich ein luftdurchlässiger Film, der mit Wasser leicht abwaschbar ist. Betaisodona Lösung kann unverdünnt oder verdünnt für feuchte Umschläge, Spülungen und Waschungen verwendet werden. **Gegenanzeigen:** Manifeste Hyperthyreose, Dermatitis herpetiformis Duhring (sehr selten); vor einer Radioiodtherapie. Bei bekannter Iodüberempfindlichkeit, Schilddrüsenerkrankungen, sowie bei Schwangeren ab dem 3. Monat sollten Betaisodona Mikrobizide nur nach strenger Indikationsstellung angewandt werden. Hinweise: Bei Patienten mit milden Knotenstrumen und nach Schilddrüsenerkrankungen (besonders bei älteren Patienten) sind Betaisodona Mikrobizide über längere Zeit und großflächig nur nach ausdrücklicher Anweisung des Arztes anzuwenden. Bei Neugeborenen und Säuglingen sind Betaisodona Mikrobizide nur nach strenger Indikationsstellung anzuwenden; in diesen Fällen ist eine Kontrolle der Schilddrüsenfunktion notwendig. **Nebenwirkungen:** Betaisodona Präparate werden im allgemeinen gut vertragen, bei Iodüberempfindlichen Patienten treten bei Behandlung mit Betaisodona Mikrobiziden Irritationen äußerst selten und meist nur vorübergehend auf.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln: Betaisodona Mikrobizide sollten nicht zusammen mit quecksilberhaltigen Desinfektionsmitteln verwendet werden. **Handelsformen und Preise:** **Betaisodona Salbe:** Tube mit 20 g Salbe DM 10,55 m. MwSt.; Tube mit 100 g Salbe DM 31,70 m. MwSt.; Tube mit 250 g Salbe DM 39,90 m. MwSt.; Tiegel mit 250 g Salbe DM 39,90 m. MwSt.; **Betaisodona Lösung standardisiert:** Flasche mit 30 ml Lösung DM 6,65 m. MwSt.; Flasche mit 120 ml Lösung DM 14,35 m. MwSt.; Flasche mit 1000 ml Lösung DM 39,05 m. MwSt.; Kanister mit 5000 ml Lösung DM 124,45 m. MwSt. MUNDIPHARMA GmbH, 6250 Limburg (Lahn) Stand Februar 1986 **Leistung für Arzt und Patient** BSL-Z-8602

Zur Abtreibung über die Grenze nach China

In Shenzhen, der chinesischen Nachbarzone von Hongkong, arbeiten Abtreibungskliniken rund um die Uhr. Sie bieten ihre Dienste in den Zeitungen Hongkongs offen an. Reiseunternehmen besorgen die gruppenweise Beförderung der Frauen über die Grenze in die Volksrepublik. Den Patientinnen wird nur 1/5 bis 1/3 des in Hongkong geforderten Preises, nämlich zwischen 100,- und 200,- DM, für den Eingriff abverlangt, und es werden keine Fragen gestellt, wie Newsweek erfahren hat. Die einzige Bedingung ist die Bezahlung in harter Währung. In der Volksrepublik ist die Geburtenregelung legal,

leicht erhältlich und wird von der Regierung als Maßnahme der Geburtenplanung gefordert, während im kapitalistischen Hongkong strenge Bestimmungen – Befürwortung durch zwei Ärzte und Vorliegen eines physischen oder psychischen Notstandes – bestehen. Zahlreiche Frauen, darunter Schulmädchen und Schwangere im letzten Trimenon, nehmen diese Dienste in Anspruch. Es werden aber auch schon die ersten Klagen laut. Patientinnen haben von dem Eingriff Infektionen mitgebracht, die zur Sterilität führen.

(Newsweek, 23. Juni 1986) (ok)

Aufgetankt und plattgedrückt

Leichen auf den Straßen in Sommernächten beschreibt die International Herald Tribune als ein in mehreren Südstaaten der USA ziemlich häufiges „ländliches Phänomen“. In North Carolina wurden in 5 Jahren 136 Tote nachts auf den Straßen gefunden. Im Staat Tennessee in einem Jahr 31, in Arizona waren es 13, meistens Indianer. Der Leichenbeschauer Dr. Lawrence S. Harris: „In den meisten Fällen waren die Opfer bewusstlos betrunken.“ Ein regionales Blatt in North Carolina hat das Geschehen unter der lapidaren Überschrift kommentiert: „Aufgetankt und plattgedrückt“.

stolpernden Betrunkenen würden von der wärmeausstrahlenden Asphaltdecke angezogen, und ein Patrouillenbeamter der Polizei bestätigte, „der nach Hause wankende Betrunkene lege sich der Wärme wegen auf die Straße“.

Über Zusammenhänge zwischen Alkohol und Hitze bzw. Kälte berichtet auch der New Scientist nach einer Studie des Toxikologen Ronald Alkana von der Universität Südkalifornien. Er fand bei Experimenten mit Mäusen eine lineare Beziehung zwischen der Körpertemperatur und der Empfindlichkeit des Gehirns gegen Alkohol.

Dr. Harris erläutert, die in der kühlen Nacht dahin- Steigende Temperatur erhöht die Alkoholwirkung, fallende Temperatur