

La Procréation Consciente

Fut Personne

D'après les travaux de Knaus et Ogino
par le Professeur D^r Paul Belmas.

I La période ovarienne

A. La traduction clinique

- a) existant avant la puberté et après la ménopause
- b) caractéristique de la vie sexuelle de la femme.

1) menstruation ou débâclement utérin, quant non gravid
a) sa périodicité

I. les la plupart des cas si régulières que surnommées "re"

A: en principe tous les 28 jours d. 40% des cas

B: mais aussi types constants quoique modifiés

a) soit allongés de 1 à 6 jours (20%)

b) raccourcis de 1 à 6 " (20%)

II Parfois cependant irrégulières (20%)

a) immédiatement précédée d'une brèche de malaises et d'une vague de désir physique.

2) intermenstruel ou apnée de la partu infér par constatations opéatoires.

a) se manifeste entre 2 règles ou mieux, 14 jours avant la suivante (Ogino)

b) les signes

I Fonctionnels

A: vague de désir physique intermenstruelle

B: sensation de pesanteur abdomino-pelvienne.

II Physiques

A: au spéculum: glaires cervicales de Bernaigne et Lignon

B: au toucher: augmentation de volume de l'ovaire de Staffer

B. Leur Mécanisme Physiologique

a) sécrétion par l'antéhypophyse d'hormones

1) avant la puberté: hormones de croissance

2) après la puberté: hormones gonadotroques, ou prolan A

b) le prolan A, chef de l'ovaire, du jour 1 postmenstruel déclenche la maturation du follicule

1) la folliculine, chef de l'utérus, reconstruit la muqueuse avant l'intermenstrum

2) vers la mi-période, ponte ovarienne, d'où sollicitation